
Pollen / m³ Luft
Beifuß
Pollenflug
über
ausgewählten
Messstellen
2017
Weser-Ems 94-16
Oberjoch (Oberallgäu)
Weser-Ems (westl. Nieders.)
Mannheim (Oberrheingraben)
Berlin (2 Stationen)
Sylt
Reinbek bei Hamburg
Leiden (holl. Nordseeküste)
Helmond (südl. Niederlande)
NRW (4 Stationen)
Freiburg
Weser-Ems 94-16
25
20
15
10
5
0
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep


Pollen / m³ Luft
Beifuß
Pollenflug
über
ausgewählten
Messstellen
2017
vs
2016 (Mittel)
Berlin
Reinbek bei Hamburg
Weser-Ems (westl. Nieders.)
Mannheim (Oberrheingraben)
Sylt
NRW
Leiden (holl. Nordseeküste)
Helmond (südl. Niederlande)
Freiburg
Oberjoch (Oberallgäu)
Mittel 2017
Mittel 2016 (40 Stationen)
25
20
15
10
5
0
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep


Saisonsumme (1.6. - 30.9.2017)
Beifuß
Pollen
2017
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
400
39
147
Berlin
Reinbek b. Hamburg
Mannheim
Weser-Ems
Leiden
NRW
Helmond
Sylt-Westerland
Freiburg
Oberjoch
Mittel


Pollen / m³ Luft
Beifuß
Pollenflug
über
ausgewählten
Messstellen
1995 - 2017
Dresden
Weser-Ems
Leiden (ohne 97)
Helmond
Freiburg (ab 98)
Oberjoch
25
20
15
10
5
0
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep