
Sporen / m³ Luft
Cladosporium
Sporenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst,Ganderkesee)
2014
vor allem im Sommer und Herbst: Regen und Wärme befördern die Produktion der Sporen, Sonne (Thermik) befördern deren Verbreitung!
Weser-Ems 94-13
Weser-Ems
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.maximum
°C
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep
1. Okt
1. Nov
1. Dez


Cladosporium
Sporenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2014
Sporen / m³ Luft
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep
1. Okt
1. Nov
1. Dez
Weser-Ems 94-13
Weser-Ems
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.maximum
vor allem im Sommer und Herbst: Regen und Wärme befördern die Produktion der Sporen, Sonne (Thermik) deren Verbreitung !


Sporen / m³ Luft
Cladosporium
Sporenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2014
Weser-Ems 94-13
Ganderkesee
Delmenhorst
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.maximum
°C
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep
1. Okt
1. Nov
1. Dez