
prozentuale Anteile der Saisonsummen an der mittleren Saisonsumme für Ganderkesee
Die Änderungen von Jahr zu Jahr erfolgen meist synchron!
Delmenhorst
Ganderkesee
Rotbuche
Pollen
über
Delmenhorst
und
Ganderkesee
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
293%
0%
479%
0%
59%
69%
38%
46%
69%
100%
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Mittel


prozentuale Anteile der Saisonsummen an der mittleren Saisonsumme
Rotbuche
Pollen
über
Weser-Ems
(Delmenhorst + Ganderkesee)
Ausgeprägte Schwankungen in der Pollenproduktion von Jahr zu Jahr sind typisch für die Rotbuche! Aber in den letzten sechs Jahren nicht mehr so extrem!
500%
400%
300%
200%
100%
0%
430%
0%
0%
0%
88%
76%
50%
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Mittel
wenig-viel-Rhythmus
wenig-viel-Rhythmus
wenig-viel-Rhythmus


Pollen / m³ Luft
Rotbuche
Pollenflug
über
Weser-Ems
ab 94
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun
11
00
04
95
07
09
06
98
14
94
13
16
19
18
24
23
25
22
21
17
20
94-25
nur die Flächendiagramme
der letzten 10 Jahre
sind farblich differenziert.