
Pollen / m³ Luft
In 2020 ließen sich die Hainbuchen mit dem (sehr schwachen) Stäuben viel Zeit - ganz im Gegensatz zu den vorgelagerten Frühblühern!
2021 brachte wieder mehr Hainbuchenpollen, aber deutlich weniger als erwartet.
Dennoch folgt der Hainbuchen-Pollenflug dieses Jahres dem biannuellen Rhythmus und fällt damit schwächer aus als im Vorjahr.
Hainbuche
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
Weser-Ems 95-21
Weser-Ems 22
Weser-Ems 21
Weser-Ems 20
Temp.maximum 22
°C
100
0
35
30
25
20
15
10
5
0
1. Mrz
1. Apr
1. Mai


Pollen / m³ Luft
°C
Weser-Ems 95-21 (gleitende Mittel)
Weser-Ems (Tagesmittel)
Weser-Ems (gleit.Mittel)
Temp.maximum (Tagesmittel)
Hainbuche
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2022 vs 95-21
anfangs
Ferntransport!
100
80
60
40
20
0
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Mrz
1. Apr
1. Mai


Pollen / m³ Luft
Hainbuche
Pollenflug
über
zwei Weser-Ems-Messstellen
(Delmenhorst Ganderkesee)
2022 vs 95 - 21
Im relativ warmen Stadtklima sind die Hainbuchen ihren Artgenossen auf dem Land in der Startphase des Stäubens üblicherweise deutlich voraus.
Dieses Jahr macht eine Ausnahme!
Weser-Ems 95-21
Delmenhorst
Ganderkesee
Temp.maximum (Delm.+ Gand.)
°C
100
80
60
40
20
0
35
30
25
20
15
10
5
0
1. Mrz
1. Apr
1. Mai