



Pollen / m3 Luft
Hainbuche
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
In 2026 setzte der Anstieg der Pollenkonzentration wie bei der Esche und Weide sehr früh ein - sehr wahrscheinlich bedingt durch Hainbuchenpollen, die aus wärmeren Gebieten herangeweht wurden (siehe Vergleich der beiden Messstellen).
°C
100
0
35
30
25
20
15
10
5
0
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
Ferntransport
Weser-Ems 95-25
Weser-Ems 26
Weser-Ems 25
Weser-Ems 24
Temp.maximum 26


Pollen / m3 Luft
°C
Hainbuche
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2026 vs 95-25
Weser-Ems 95-25 (gleitende Mittel)
Weser-Ems (Tagesmittel)
Weser-Ems (gleit.Mittel)
Temp.maximum (Tagesmittel)
100
80
60
40
20
0
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Mrz
1. Apr
1. Mai


Pollen / m3 Luft
Hainbuche
Pollenflug
über
zwei Weser-Ems-
Messstellen
(Delmenhorst Ganderkesee)
2026 vs 95-25
Weser-Ems 95-25
Delmenhorst
Ganderkesee
Temp.maximum (Delm.+ Gand.)
°C
Im relativ milden Stadtklima sind die Hainbuchen ihren Artgenossen auf dem Land in der Startphase des Stäubens üblicherweise deutlich voraus. Nicht so in 2026!
Ferntransport
100
50
0
35
30
25
20
15
10
5
0
1. Mrz
1. Apr
1. Mai